İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO : 24.04.2006 / 5497

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
KABAK	Tütün beyazsineği (*Bemisia tabaci*)	100 ml/da	3 gün
DOMATES (SERA)	Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*)	50 ml/da (Larva)	3 gün
PATLICAN (TARLA)	Tütün beyazsineği (*Bemisia tabaci*)	100 ml/da (Larva-Pupa-Ergin)	3 gün
FASULYE	Yaprakbiti (*Aphis* spp.)	50 ml/da	3 gün
ELMA	Elma içkurdu (*Cydia pomonella*)	15 ml/100 L su	3 gün
	Elma ağkurdu (*Hyponomeuta malinellus*)	5 ml/100 L su	
ARMUT	Armut psillidi (*Cacopsylla pyri*)	50 ml/100 L su	3 gün
BAĞ*	Dürmece (*Sparganothis pilleriana*)	50 ml/100 L su	3 gün
	Bağ salkım güvesi (*Lobesia botrana*)	30 ml/100 L su	
ANTEPFISTIĞI	Antepfıstığı psillidi (*Agonoscena pistaciae*)	30 ml/100 L su	3 gün
PATATES	Patates böceği (*Leptinotarsa decemlineata*)	30 ml/da	3 gün
MERCİMEK NOHUT	Hortumlu böcek (*Sitona* sp.)	50 ml/da	3 gün
	Apion (*Apion arrogans*)	50 ml/da	
	Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*)	20 ml/da	
	Mantolu böcek (*Amicta oberthuri*)	30 ml/da	
MISIR	Mısır koçankurdu (*Sesamia* spp.)	50 ml/da (15 gün ara ile 3 uygulama)	3 gün
ŞEKER PANCARI	Şekerpancarı piresi (*Chaetocnema* sp.)	25 ml/da	3 gün
	Bozkurt (*Agrotis* sp.)		
	Kalkan böceği (*Cassida* sp.)		
HUBUBAT	Süne (*Eurygaster* spp.)	30 ml/da (1-3. dönem nimf) 50 ml/da (4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin)	3 gün
	Hububat hortumlu böceği (*Pachytychius hordei*)	30 ml/da	
	Ekin kamburböceği (*Zabrus* spp.)	20 ml/da (Satıh uygulaması)	
ZEYTİN	Zeytin sineği (*Bactrocera oleae*)	25 ml/100 L su	3 gün
	Zeytin güvesi (*Prays oleae*)	30 ml/100 L su	
	Zeytin karakoşnili (*Saissetia oleae*)	25 ml/100 L su	
AYÇİÇEĞİ	Çayır tırtılı (*Loxostege sticticalis*)	25 ml/100 L su	3 gün
	Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*)	75 ml/100 L su	
FINDIK	Kır tırtılı (*Lymantria dispar*)	30 ml/100 L su	3 gün
KİRAZ	Kiraz Sineği (*Rhagoletis cerasi*)	25 ml/100 L su	3 gün

***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. Tic. Ltd. Şti.)

cansa

DECAN 2.5 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

25 g/l Deltamethrin

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bitki koruma ürünü bitki üzerinde kuruduktan sonra girilmesinde mahsur yoktur.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼'ü kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Solunması halinde zararlıdır. Yutulması halinde zararlıdır. Karın ağrısı, bulantı, kusma, çarpıntı ve aspirasyon tehlikesi. Cilt tahrişine yol açar. Cilt ve mukoza tahribatı varsa, genelde geçici 24 saat içinde geri dönüşümlüdür. Ciddi göz hasarına yol açar.

02 Aralık 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı
KABUL EDİLMİŞTİR.

NET MİKTARI :
AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:
Deltamethrin, Emulsifier blend anionic/nonionic, Dimethylbenzenes

ZARARLILIK İŞARETLERİ:

TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:
H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P264: Kullanım sonrası vücudun kirlenmiş kısımlarını su ile iyice yıkayınız
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P302+P350: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.
P304+P340:SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın, ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P305+P351+P338:GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun
P501: İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR
Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.S.B. Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:

Patlıcanda ve Kabakta Tütün beyazsineğine karşı: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Fasulye yaprakbiti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta tupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye karar verilir.

Domateste yeşilkurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elma içkurdu: Elma içkurdu'na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Dürmece: İlkbaharda larvaların kışlaklardan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten itibaren 10 ve 30 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mercimekte Mantolu böceğe karşı: Çok yoğun bulaşmalarda ilaçlama yapılmalıdır.

Mercimekte Hortumlu böceğine karşı: Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bitkiler 5-10 cm boyundayken bir kez ilaçlama yapılır.

Mercimekte Apion'a karşı: Ergin mücadelesinde m^2'de ortalama 3-5 ergin veya daha fazla olduğunda, larva için bitki başına 3 veya daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu olduğunda veya tepe tomurcuklarında %10'un üzerinde bulaşma olduğunda uygulama yapılır.

Armut psillidi'ne karşı: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15'ten fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Patates böceğine karşı: Günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C'ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğun bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40'a kadar çıkmaktadır.

Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. Tic. Ltd. Şti.)

cansa

DECAN 2.5 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

25 g/l Deltamethrin

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile temas halinde: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Ilık su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Eğer Anestetik göz damlalarına ihtiyaç olursa, ağrıyı azaltan göz damlaları uygulayın. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınız.

Yutulması halinde: Hastanın bilinci yerindeyse, ağzı suyla iyice çalkalayın. Bilinci kapalı olan hastaya ağızdan bir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır.

Cilt ile temas halinde: Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Kirlenmiş giysileri kullanmadan önce yıkayın.

Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından hastaya oksijen verilebilir. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Solunumla ilgili ve kalple ilgili fonksiyonlar izlenmelidir. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Solunum borusunu açık tutunuz. Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yapınız. Çırpınma durumlarına karşı, standart perhizlere göre benzodiazepin (örneğin: diazepam) verilebilir. Tesirli değilse, phenobarbital kullanılabilir. Kontraendikasyon : Atropin. Kontraendikasyon : Adrenalin türevleri. Özel bir antidot bilinmiyor.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

02 Aralık 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECE HUSUSLAR:

*Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
*Bekleme süresine uyunuz.
*İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz.
*Rüzgârlı havada ilaçlama yapmayınız.
*Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
*Ambalajı kapalı olarak muhafaza ediniz.
*Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka gaye için kullanmayınız.
*Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl süre ile hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.
Melek Aras Bulvarı No:39
34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58
www.cansakimya.com.tr

Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR
Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.S.B Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2627
Sermayesi: 3.100.000 TL.

Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.
Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10 dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10'unda canlı "yumurta+larva" olduğunda ilaçlama yapılır.
Zeytin sineğine karşı: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.
Zeytin karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinden bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50'sinin açıldığı devrede birinci, %90'ının açıldığı devrede ise ikinci ilaçlama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
DECAN 2.5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DECAN 2.5 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

DECAN 2.5 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

25 g/l Deltamethrin

02 Aralık 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR
Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya Sanayi O.S.B. Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL.