

RACINE




KÖK GELİŞİMİ

Uygulama Şekli:

Sebzeler ve süs bitkileri:

Çelik ve fideler hazırlanan çözeltiye batırılır, 60 dakika bekletilir sonra dikilir. Dikimden sonra her çelik veya fideye 150 ml çözelti **can suyu** olarak verilir. Bu uygulamalar 100 l suya 25 ml **RACİNE** şeklinde uygulanır.



Meyve, bağ, narenciye, orman ağaçları: Fidan ve çelikler, dikimden önce bu çözeltide 1-2 saat bekletilir ve dikilir. (100 l suya 50 ml) dikimden sonra yeterli suyla fidan köklerine verilir ve yıl içinde 3 kez tekrarlanır.

Tüm bitkiler: Damlama sulama ile 7-10 gün ara ile en az üç kere verilir. (Dekara 150 - 200 ml)

RACİNE

MEYVE SEYRELTME

Uygulama Şekli:

Elmada meyveler nohut büyüklüğüne gelince seyreltmeye yardımcı olması amacıyla 750 ml / Ton dozunda alttan 2 nozul kapatılarak uygulanıyor.



ÇATLAMA

Uygulama Şekli:

Kirazda meyvelere ben düşünce çatlamaya karşı korumak amacıyla 500 ml / Ton dozunda 1 kez kullanılır.



RACİNE

SAP GÜÇLENDİRME

Uygulama Şekli:

Elma, armut, ayva, kayısı, şeftali, kiraz, vişne, zeytin, antepfıstığı, narenciye, bağ: Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının 15'inde meyve dökümüne engel olmak ve meyvenin renginin tadının daha iyi oluşması için potasyumlu yaprak gübresi ile karıştırılarak çiçeklenmeden 3-4 hafta önce uygulanır ve meyveler fındık büyüklüğünü alınca tekrarlanır. (3 uygulama 100 l suya 50-100 ml)



ASAHI CHEMICAL MFG. CO., LTD.



OAT Agrio Co., Ltd.

cansa

KİMYA SANAYİİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
İSTANBUL TUZLA KİMYA SAN. O.S.B.
MELEK ARAS BULVARI NO:39
34956 TEPEÖREN-TUZLA/İSTANBUL
TEL: 0216 593 20 50 (PBX)
FAX: 0216 593 20 57-58